

LES PRINCIPAUX CRITÈRES D'IDENTIFICATION

Quand vous êtes dehors, détectez les mouvements et soyez attentif aux sons. Dès que vous apercevez un oiseau, ne le perdez pas de vue et essayez de l'observer de plus près avec des jumelles.

L'identification demande de la pratique. Notez la taille de l'oiseau, sa forme, sa couleur, son comportement, les sons qu'il produit et l'habitat. Prêtez attention aux traits distinctifs, comme la grosseur et la forme du bec et les bandes sur le corps et les ailes.

• La taille



Elle peut être difficile à déterminer à grande distance et sans point de repère (oiseau en plein vol). Cependant, même une idée approximative permet de réduire le champ des possibilités.

• La forme générale

Il s'agit de regarder les dimensions relatives de chacune des parties du corps les unes par rapport aux autres, plus facile que la taille absolue de l'oiseau. On regardera ainsi la longueur de la queue par rapport au corps, la forme et la longueur des ailes, la taille du cou, des pattes, la forme trapue ou allongée du corps, etc.

• La forme et la longueur du bec

C'est l'organe le plus important de l'oiseau, directement lié à son régime alimentaire. Un bec court et épais (moineau) correspond à un granivore, un bec fin (fauvette) à





66

PÉLÉCANIFORMES / ARDÉIDÉS

HÉRON CENDRÉ

Ardea cinerea

P	E	A	H

Taille : 98 cm ♦ Envergure : de 175 à 195 cm ♦ Poids : de 600 g à 1,2 kg



Vu le : À :

DESCRIPTION Dessus gris. Rémiges noires. Dessous blanchâtre, avec le devant du cou blanc net strié de noir. Longues plumes sur la poitrine et les scapulaires. Tête, calotte, joues et menton blancs. Large bande noire s'étendant des yeux jusqu'à la nuque, prolongée par de longues aigrettes noires. Bec orangé, en forme de dague. **Hiver** Plumage un peu plus terne, sans les longues plumes.

HABITAT La plupart des zones humides.

ALIMENTATION Se nourrit essentiellement de poissons, ainsi que d'amphibiens. En intersaison, on le voit souvent en prairie, où il chasse les campagnols et probablement aussi les vers de terre.

REPRODUCTION De 3 à 5 œufs mats bleu-vert clair. Incubation de 26 jours, assurée par les deux parents. Poussins nidifuges.



ARDÉIDÉS / PÉLÉCANIFORMES

67

HÉRON POURPRÉ

Ardea purpurea

P	E	A	H

Taille : 90 cm ♦ Envergure : de 120 à 150 cm ♦ Poids : de 600 g à 1,4 kg



Vu le : À :

DESCRIPTION Dessus gris ardoisé parsemé de roux çà et là. Poitrine brun-roux s'ornant de longues plumes en été. Abdomen noir avec flancs et scapulaires roux pourpré. Calotte noire. Arrière du cou brun roussâtre ; blanc sur le devant, avec des stries noires.

HABITAT Marais et rives d'eau stagnante comprenant de larges étendus de roselières et peu d'arbres.

ALIMENTATION Se nourrit de poissons, mollusques, crustacés, insectes aquatiques, larves, reptiles, petits rongeurs et petits oiseaux.

REPRODUCTION De 2 à 5 œufs bleu-vert clair. Incubation de 25 à 30 jours, assurée par les deux parents. Poussins nidicoles.



ROUGE-QUEUE NOIR

Phoenicurus ochruros



Taille : 15 cm ♦ Envergure : de 23 à 26 cm ♦ Poids : de 14 à 20 g



Vu le : À :

DESCRIPTION **Mâle** Dessus gris anthracite. Zone blanchâtre sur les rémiges secondaires. L'avant du corps est noir de suie. Un peu de blanc parfois visible sur la calotte. Ventre gris. Queue gris-brun au niveau des rectrices centrales ; rectrices externes orange. Croupion et dessous de la queue orange vif. **Femelle** Plumage gris nuancé de brun. Dessous gris-beige, avec les sous-caudales orange pâle.

HABITAT Milieux rupestres naturels (falaises, éboulis rocheux, versants rocaillieux, ravins...) ou artificiels (constructions humaines).

ALIMENTATION Insectes et leurs larves, araignées, millepattes, petits mollusques, petits lombrics.

REPRODUCTION De 4 à 6 œufs blancs brillants, couvés par la femelle seule pendant environ 13 jours. Poussins nidicoles.



ROUGE-GORGE

Erithacus rubecula



Taille : 14 cm ♦ Envergure : de 20 à 22 cm ♦ Poids : de 16 à 22 g



Vu le : À :

DESCRIPTION Petit oiseau rondet aux ailes assez courtes. Grande zone orange sur le devant du corps, le front, le cou et la poitrine, bordée d'un bandeau gris clair. Ventre blanc sale lavé de roussâtre sur les flancs. Dessus brun uniforme. Rémiges bordées de chamois.

HABITAT Tous les biotopes offrant un peu de couvert : de préférence forêts, mais aussi présent dans les jardins et les haies.

ALIMENTATION Essentiellement insectivore. À la mauvaise saison, se tourne volontiers vers les baies charnues de divers arbustes.

REPRODUCTION De 5 à 7 œufs blanc bleuté avec des taches rouges. Incubation de 11 à 14 jours, assurée par la femelle seule. Poussins nidicoles. Envol à l'âge de 12 à 15 jours.