



4

## STRIGIFORMES / STRIGIDÉS

# CHEVÈCHE D'ATHÉNA

*Athene noctua*

P	E	A	H
■	■	■	■

Taille : 26 cm • Envergure : de 54 à 58 cm • Poids : de 150 à 200 g



Vue le : ..... À : .....

**DESCRIPTION** Espèce de petite taille, ronde et trapue, avec une tête aplatie et un front bas caractéristiques. Plumage brun tacheté de blanc dessus ; blanc strié de brun dessous. Calotte brune mouchetée de blanc. Disques faciaux bruns et blancs. Œil jaune doré surmonté d'un sourcil blanc formant un X, lui donnant un air sévère. Bec jaune paille à jaune verdâtre. Tarses emplumés de blanc.

**HABITAT** Prairies pâturées, campagne cultivée, vieux vergers, jardins, parcs arborés, ruines de bâtiments.

**ALIMENTATION** Surtout de gros insectes, mais aussi lombrics et petits mammifères (campagnols).

**REPRODUCTION** De 3 à 6 œufs lisses et blancs, couvés par la femelle pendant 28 à 33 jours. Poussins nidicoles. Envol à 30-35 jours.

**COMPORTEMENT** Les « déhanchements » de sa tête sont caractéristiques, de même que son vol ondoyant et son cri clair et bref, sorte de « kiou kiou » ou « kiwitt ». C'est la plus diurne des Strigidés, malgré son nom latin *noctua*, qui signifie « oiseau de nuit ». On peut l'observer en plein jour perchée sur des poteaux, des murets de pierre ou sur des toits, très attentive.



## 6 | PASSÉRIFORMES / PARIDÉS

### MÉSANGE BLEUE

*Cyanistes caeruleus*



Taille : 12 cm • Envergure : de 12 à 14 cm • Poids : de 9 à 12 g



Vue le : ..... À : .....

**DESCRIPTION** Plumage à dominante bleu cobalt sur la calotte, les ailes et le dessus de la queue (le bleu de la femelle est plus terne). Joues et front blancs. Collier bleu-noir plus large sur le menton et la nuque. Bandeau noir traversant l'œil. Manteau jaune-vert. Barre alaire blanche. Dessous jaune citron, avec une ligne médioventrale noirâtre légèrement esquissée. Bec et pattes gris bleuté.

**HABITAT** Forêts mixtes ou de feuillus, bosquets, ripisylves, haies arborées du bocage, parcs, vergers et jardins, milieux urbains arborés.

**ALIMENTATION** Insectivore (chenilles notamment), frugivore et granivore.

**REPRODUCTION** De 9 à 13 œufs couvés de 13 à 15 jours par la femelle seule. Poussins nidicoles. Envol à l'âge de 19-20 jours.

**COMPORTEMENT** L'espèce est familière, sociable et gréginaire. L'adulte toujours très actif est sédentaire : il reste généralement toute l'année dans son environnement et ne change pas d'endroit. Le comportement varie selon les saisons : au printemps, on les rencontre par paires (couples sur leur site de nidification) ; en été, les mésanges se regroupent par clan familial (un couple dominant, des jeunes de l'année et quelques adultes « célibataires ») ; en automne et en hiver, elles vivent en bandes nombreuses qui entreprennent des voyages plus ou moins étendus à la recherche de sites de nourriture.



## 8 | PASSÉRIFORMES / CORVIDÉS

# CASSENOIX MOUCHETÉ

*Nucifraga caryocatactes*

P	E	A	H
■	■	■	■

Taille : 34 cm • Envergure : de 53 à 55 cm • Poids : de 150 à 200 g


Vu le : ..... À : .....

**DESCRIPTION** Plumage brun sombre, paraissant noir de loin, tacheté de blanc sur le dos et la face inférieure du corps. Les taches sont en forme de traits et de gouttes, plus serrées sur la face, où elles forment un masque clair qui contraste avec le bec noir, long et robuste, et la calotte brun foncé uni. Ailes brun-noir. Queue noire avec l'extrémité blanche sur le dessus. Sous-caudales entièrement blanches.

**HABITAT** Forêt de conifères (surtout épicéas), de préférence d'altitude. En hiver, vergers, jardins, bois et parcs en plaine.

**ALIMENTATION** Essentiellement graines de pins et d'autres conifères. À défaut, il se nourrit de châtaignes, glands, faines et fruits charnus.

**REPRODUCTION** De 3 à 4 œufs couvés par le couple entre 16 et 18 jours. Poussins nidicoles.



**COMPORTEMENT** C'est une espèce discrète et timide qui, s'il n'y avait ses cris éraillés, passerait inaperçue. Pour l'hiver, il cache ses réserves de nourriture dans plusieurs caches qu'il disperse sur tout son domaine et mémorise grâce à des repères visuels. Pour extraire les graines des cônes et les amandes des noisettes, il les attrape en glissant son bec entre les écailles des cônes, ou frappe la noisette sur une branche ou un rocher pour l'ouvrir. Il frappe parfois si fort qu'on peut l'entendre de loin.

## CONSTRUIRE UN NICHOIR BOÎTE AUX LETTRES

C'est le modèle de base à installer au jardin, car le plus facilement occupé par les oiseaux, en particulier les mésanges.

1. Utilisez une planche de bois non traité de 2 cm d'épaisseur, 20 cm de large et 150 cm de long. Tracez les marques de découpe comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
2. Sciez la planche en morceaux et faites le trou d'entrée à l'aide d'une perceuse. Le trou doit avoir un diamètre de 28 à 40 mm selon l'espèce visée (cf. tableau page XX).
3. Percez deux trous dans le fond, en haut et en bas, pour permettre de le fixer à l'arbre.
4. Cluez ou vissez les pièces du nichoir comme indiqué, à l'exception du toit, qui sert de couvercle pour nettoyer le nichoir.
5. Fixez le toit au corps avec une bande de cuir ou chambre à air pour former une charnière et empêcher la pluie de pénétrer. Le couvercle peut être fixé de chaque côté à l'aide de petits crochets métalliques.

### La mise en place

Le nichoir doit être placé à au moins 3 m du sol, hors de portée des prédateurs. Les murs sont plus sûrs que les arbres dans une certaine mesure, car les chats ont du mal à y grimper.

Essayez de positionner les nichoirs à différentes hauteurs pour voir quelles espèces les utilisent et dans quelles conditions. Assurez-vous que tous les nichoirs sont orientés vers l'est ou le sud-est, afin d'éviter un trop fort ensoleillement et les pluies battantes.

